

DIGESTIVE DISEASE AND NUTRITION CENTER OF WESTCHESTER, LLP.

JACK ROSEMARIN, M.D., F.A.C.G.
ALFRED ROSTON, M.D., F.A.C.G.
CHARLES NOYER, M.D., F.A.C.G.
BENJAMIN MARANO, M.D., F.A.C.G.
ROBERT GOLDBLATT, M.D., F.A.C.G.
ROSEMARIE ARENA, M.D., F.A.C.G.



2 Westchester Park Drive
Suite L1
White Plains, New York
10604
Fax: (914) 683-1026
www.stomachmds.com

PREPARACION PARA UNA COLONOSCOPIA CON MOVIEPREP

Physician: Rosemarin Roston Noyer Marano Goldblatt Arena

Fecha del procedimiento _____ Hora _____ Hora de llegada _____

Su procedimiento será en:

New York Endoscopy Center
Two Westchester Park Drive, Suite 104
White Plains, NY 10604
Presentese al primer piso
Ph. (914) 683-1555

SIETE días antes del examen deje de tomar Aspirina, Hiero, pepto-Bismol, y suplementos que contienen ajo, jengibre, Ginkgo Biloba, Ginsen, la palma enana Americana, y Vitamina E. Llene su receta en cualquier farmacia. Reduzca su consume de frutas, verduras, frutos secos, bayas, etc.

TRES días antes del examen deje de tomar anti-inflamatorios sin esteroides (AINE-Motrin, Advil, Aleve, etc). Usted puede tomar Tylenol. Si usted está tomando Coumadin, Lovenox, o agentes contra las plaquetas (Ticlid o Plavix), consulte con su medico.

Notar: Antes de iniciar los siguientes pasos recoja su receta de Movieprep.

EL DIA ANTES DEL PROCEDIMIENTO

En la mañana prepare el primer litro de Movieprep. Movieprep se prepara vaciando el contenido de bolsa "A" y bolsa "B" en el estuche plástico disponible. Llene hasta la linea complete con aqua tibia mezcle hasta que los ingredients se layan disuelto completamente, refrigerar o agregar hielo a la solución.

La dieta del dia constara SOLAMENTE de liquidos claros. Esto incluye: agua, refrescos, caldo (de pollo o carne de res sin grasa). SOLAMENTE PUEDE TOMAR EL CALDO!!!! Gatorate, Kool-Aid, gelatin (Jello), paletas heladas, café o té sin leche/crema no láctea, jugos de frutas claros como (manzana, uva blanca, arándano blanco) y caramelos duros. **No ingiera líquidos del color rojo y tampoco gelatin roja (jello).**

A las _____ **PM**, la noche antes del procedimiento beba un vaso de 8 onzas de Moviprep cada 15 minutos hasta que la solución ha terminado. Usando el mismo estuche plástico prepare el segundo litro de Moviprep, vaciando el contenido de bolsa "A" y bolsa "B". Llene hasta la línea completa con agua tibia mezcle hasta que los ingredientes se hayan disuelto completamente, refrigerar. Alrededor de una hora y media más tarde o a las 12AM (medianoche) empiece a tomar el Segundo litro de Moviprep y beba un vaso de 8 onzas cada 15 minutos hasta que la solución ha terminado. En adición tome un litro de líquidos claros durante la noche.

NO COMA nada hasta después del examen

MAÑANA DEL EXAMEN

Debe tomar sus medicamentos regulares (medicamentos para presión arterial, para el corazón, etc.) con un pequeño sorbo de agua.

Para que este procedimiento se puede realizar, usted necesita ir acompañado de un amigo o familiar que lo conduzca a su casa. Usted no va a ser dado de alta del centro si no va acompañado por un adulto que sea que lo vaya a conducir a su casa o acompañar a su casa en taxi o en transporte público.

SOBRE EL PROCEDIMIENTO

La colonoscopia es un procedimiento que examina la capa interna del intestino grueso. Anormalidades pueden ser descubiertas y muestras de tejido (biopsias) pueden ser obtenidas. Los pólipos pueden ser removidos y se examinan bajo un microscopio.

El instrumento utilizado es flexible y tiene un Sistema de video adentro. El tubo se introduce en el recto y se introduce aire para permitir una mayor visualización. Esto puede causar cólicos leves o hinchazones abdominales. Los sedantes son dados de manera intravenosa para que se sientan más cómodos. Cualquier alergia a medicamentos conocidos o reacciones adversas a los medicamentos deben ser comunicados antes del procedimiento.

Después del procedimiento usted será llevado a la sala de recuperación donde usted permanecerá por unos treinta a sesenta minutos, pero este tiempo puede variar de acuerdo a su condición. Se le dará a usted instrucciones detalladas de descarga antes que lo den de alta.

RIESGOS

Ningún procedimiento puede garantizar el 100% de precisión diagnóstica y todos implican algún riesgo. La decisión de proceder se hace después de evaluar los riesgos y beneficios potenciales. Las complicaciones graves son raras e incluyen pero no se limitan a perforación del colon hemorragia, infección. Reacción a medicamentos, y la necesidad de cirugía o transfusión debido a una de las complicaciones mencionadas. Estas ocurrencias son raras.

*Si usted está tomando Plavix, Aspirina, o Coumadin debido a un historial de endoprótesis (stents) coronarias, los endoprótesis (stents) carotídeos, etc., dosificación correcta durante y después de su procedimiento es esencial. Asegúrese de discutir esto con su médico.